

## APÊNDICE IV – FOLDER

VOCÊ PODE TER E NÃO SABER

**SÍFILIS NÃO**

#TESTETRATE



### O QUE É SÍFILIS?

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A doença pode apresentar várias manifestações clínicas e estágios (primária, secundária e terciária), além da sífilis congênita.

### ATENÇÃO AOS SINTOMAS



**SÍFILIS PRIMÁRIA** - Pequenas feridas nos órgãos genitais (cancro duro) que desaparecem espontaneamente e não deixam cicatrizes. Além disso, percebe-se o aumento dos gânglios e a existência de ínguas na região da virilha.

**SÍFILIS SECUNDÁRIA** - Manchas vermelhas na pele, na mucosa da boca, nas palmas das mãos e plantas dos pés; febre; dor de cabeça; mal-estar; inapetência e linfonodos espalhados pelo corpo. Embora essas manifestações possam regredir sem tratamento, a doença continua ativa no sistema.

**SÍFILIS TERCÍARIA** - Comprometimento do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular, lesões na pele e nos ossos.

**SÍFILIS CONGÊNITA** - Transmissão da doença da mãe para o bebê durante a gestação, podendo causar má formação do feto, pneumonia, cegueira, feridas no corpo, alterações nos ossos e do desenvolvimento mental ou aborto espontâneo e morte fetal.



## COMO A SÍFILIS É TRANSMITIDA? É POSSÍVEL SE PREVINIR?

#SELIGA

A transmissão se dá por meio das relações sexuais desprotegidas, e da mãe para o

filho em qualquer fase da gestação ou no momento do parto. Contudo, é possível evitá-la mediante o uso correto de preservativos. Já no caso de gestante, é imprescindível o acompanhamento pré-natal de qualidade.

## **DIAGNÓSTICO**

O diagnóstico é feito através de teste rápido de sífilis realizado pelo enfermeiro nas unidades básicas de saúde, e a sorologia laboratorial para análise, acompanhamento e tratamento.

## **COMO É O TRATAMENTO?**

O tratamento de primeira escolha é a penicilina benzatina ( Benzentacil) esta é a principal e mais eficaz forma de combater a bactéria causadora da doença, também é preciso acompanhar e tratar o parceiro sexual.



**IDENTIFICOU ALGUNS DOS  
SINTOMAS? PROCURE A  
UNIDADE MAIS PRÓXIMA E  
FAÇA O TESTE.**



# FACULDADE VALE DO CRICARÉ

Mestranda: Lusiane Lima Oliveira

Orientadora: Prof.<sup>a</sup>. Dra. Luciana B. Firmes Marinato


MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO.



MESTRANDA  
Lusiane Lima Oliveira

ORIENTADORA  
Prof.<sup>a</sup>. Dra. Luciana B. Firmes Marinato

MESTRADO PROFISSIONAL EM  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO.



VOCÊ PODE TER E NÃO SABER

## SÍFILIS NÃO

#TesteTrateCure



## O QUE É SÍFILIS?

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A doença pode apresentar várias manifestações clínicas e estágios (primária, secundária e terciária), além da sífilis congênita.

## ATENÇÃO AOS SINTOMAS

### SÍFILIS PRIMÁRIA

Pequenas feridas nos órgãos genitais (cancro duro) que desaparecem espontaneamente e não deixam cicatrizes. Além disso, percebe-se o aumento dos gânglios e a existência de ínguas na região da virilha.

### SÍFILIS SECUNDÁRIA

Manchas vermelhas na pele, na mucosa da boca, nas palmas das mãos e plantas dos pés; febre; dor de cabeça; mal-estar; inapetência e linfonodos espalhados pelo corpo. Embora essas manifestações possam regredir sem tratamento, a doença continua ativa no sistema.



### SÍFILIS TERCIÁRIA

Comprometimento do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular, lesões na pele e nos ossos.

### +SÍFILIS CONGÊNITA

Transmissão da doença da mãe para o bebê durante a gestação, podendo causar má formação do feto, pneumonia, cegueira, feridas no corpo, alterações nos ossos e do desenvolvimento mental ou aborto espontâneo e morte fetal.



## COMO A SÍFILIS É TRANSMITIDA? É POSSÍVEL SE PREVINIR?

### #SELIGA

A transmissão se dá por meio das relações sexuais desprotegidas, e da mãe para o filho em qualquer fase da gestação ou no momento do parto. Contudo, é possível evitá-la mediante o uso correto de preservativos. Já no caso de gestante, é imprescindível o acompanhamento pré-natal de qualidade.



## DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é feito através de teste rápido de sífilis realizado pelo enfermeiro nas unidades básicas de saúde, e a sorologia laboratorial para análise, acompanhamento e tratamento.

## COMO É O TRATAMENTO?

O tratamento de primeira escolha é a penicilina benzatina (Bezentacil) esta é a principal e mais eficaz forma de combater a bactéria causadora da doença, também é preciso acompanhar e tratar o parceiro sexual.



IDENTIFICOU ALGUNS DOS SINTOMAS? PROCURE A UNIDADE MAIS PRÓXIMA E FAÇA O TESTE.

#CUIDEDASUASAÚDE